




## CUANDO QUEDARSE EN CASA Y NO IR A ESCUELA...

 <p><b>TENGO FIEBRE</b></p>	 <p><b>ESTOY VOMITANDO</b></p>	 <p><b>TENGO DIARREA</b></p>	 <p><b>TENGO SARPULLIDO</b></p>	 <p><b>TENGO PIOJOS</b></p>	 <p><b>TENGO UNA INFECCION EN LOS OJOS</b></p>	 <p><b>TENGO DOLOR DE GARGANTA</b></p>	 <p><b>TENGO TOS</b></p>	 <p><b>TENGO COVID-19</b></p>	
<p>Temperatura de 100°F o más.</p>	<p>Un evento de vómito, o sarpullido, fiebre, y/o debilidad. Vomitando durante un lapso de 24 horas.</p>	<p>Un evento de diarrea acuosa o sarpullido, fiebre o debilidad. Diarrea durante un lapso de 24 horas..</p>	<p>Sarpullido en el cuerpo con fiebre o picazón. <b>Sarna:</b> sarpullido y picazón. <b>Impétigo-</b> ampollas rojas rezumantes con drenaje amarillo. <b>Varicela-</b> si las ampollas no tienen costras y presenta nuevas ampollas en 2 días.</p>	<p>Picazón en la cabeza por piojos vivos o huevos (liendres) que están más de ½ pulgada cerca al cuero cabelludo.</p>	<p>Enrojecimiento, picazón, y/o drenaje "crujiente" del/los ojo(s).</p>	<p>Dolor de garganta con fiebre o dolor de garganta severo sin fiebre.</p>	<p>Si la tos es peor de los que esperaría con un resfriado, o si el/la estudiante tiene problemas para respirar y/o el/la estudiante tiene fiebre con tos.</p>	<p>Si su prueba salió positiva +, con o sin síntomas..</p>	
<b>YO ESTOY LISTO(A) PARA REGRESAR A LA ESCUELA CUANDO...</b>									
<p>Libre de fiebre sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas (es decir, sin usar Motrin, Advil, Tylenol)</p>	<p>Libre de vómito por 24 horas.</p>	<p>Libre de diarrea por 24 horas.</p>	<p>Libre de sarpullido en el cuerpo sin fiebre ni picazón. <b>Sarna:</b> Quédate en casa por 24 horas después de que comience el tratamiento y que el médico le otorgue el permiso para regresar a la escuela. <b>Impétigo-</b>Llame a su médico para recibir tratamiento y permíttele regresar a la escuela. <b>Chickenpox-</b> all bumps must be scabbed over and no new have shown up within 2 days.</p>	<p>Todos los piojos vivos han sido removidos. Los huevos (liendres) que están a menos de ½ pulgada del cuero cabelludo han sido removidas.</p>	<p>Libre de drenaje y enrojecimiento o ha sido evaluado por su proveedor de atención médica si es necesario.</p>	<p>Si se le diagnosticó faringitis estreptocócica u otra infección bacteriana, el/la estudiante puede regresar después de 24 horas con antibióticos y el proveedor de atención médica le ha dado permiso a su niño(a) para regresar a la escuela.</p>	<p>La tos está más bajo control y la tos no distrae al estudiante de las actividades escolares.</p>	<p>Con síntomas. Después de 5 días desde el primer día de síntomas Y sin fiebre por 24 horas y con los síntomas mejorados. Debe usar la mascarilla por un total de 10 días. Sin síntomas. Después de 5 días desde la prueba positiva. Debe usar la mascarilla por un total de 10 días.</p>	

Debe mantener a su estudiante en casa y no ir a la escuela si está demasiado enfermo para participar cómodamente en el salón de clases y otras actividades escolares. Su estudiante podría propagar una enfermedad contagiosa a otros estudiantes y/o al cuerpo docente y al personal de la escuela. Lo alentamos a buscar consejo médico si tiene alguna duda acerca de enviar a su estudiante a la escuela. Su estudiante no debe regresar a la escuela hasta que esté libre de fiebre o síntomas durante 24 horas o un día escolar. Si su estudiante comienza a mostrar cualquiera de los signos de enfermedad mencionados anteriormente, será necesario que lo recoja. Mantenga toda la información de contacto de emergencia actualizada. Si un estudiante se enferma o lesiona en la escuela, debemos poder comunicarnos con usted rápidamente. Las notas de ausencia deben enviarse al maestro de su estudiante cuando regrese a la escuela. Comuníquese con la enfermera de su escuela si tiene otras preguntas o inquietudes.